


Diagnostischer Pfad

Systemischer Lupus erythematoses (SLE)

Auffällige Anamnese/klinischer Befund:

- Allgemeinzustand: Krankheitsgefühl, Müdigkeit, Unwohlsein
- Bewegungsapparat: Arthralgien, Myalgie, nichterosive Arthritis
- Haut: Schmetterlingserythem, Photosensibilität
- Herz: Serositis, Perikarditis mit Perikarderguss, Myokarditis
- Lunge: Pleuritis mit rezidivierenden Pleuraergüssen, Pneumonie
- Niere: Nephritis, Proteinurie
- ZNS: Epilepsie, Apoplex, Vigilanzminderung, Depression
- Blut: hämolytische Anämie, Thrombozytopenie, Leukopenie; sek. Antiphospholipidsyndrom
- Weitere Symptome: z. B. Lymphknotenschwellung, Übelkeit, Diarrhöen, Sicca-Syndrom, Konjunktivitis

EULAR/ACR-Klassifikationskriterien für den SLE¹:



Lit.:

1. Aringer M, Costenbader K, Daikh D et al. 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheumatol* 2019;71:1400–1412
2. Fanouriakis A et al. Update on the diagnosis and management of systemic lupus erythematosus. *Ann Rheum Dis* 2021;80:14-25

© copyright MVZ Labor 28 GmbH

DP_02_SLE_I28/ verifiziert 04/2022