




# Diagnostischer Pfad

## Antiphospholipid-Syndrom (APS) \*



\* **Primäres APS** ohne Grunderkrankung, **sekundäres APS** im Rahmen von anderen Grunderkrankungen (z. B. Autoimmunerkrankungen, Malignome) oder medikamentös induziert.

\*\* APS-Klassifikationskriterien siehe Rückseite

1) im Citrat-Blut  
2) im Serum


© copyright Labor 28 MVZ GmbH

DP\_25\_Antiphospholipid-Syndrom, verifiziert: 08/2024



# Diagnostischer Pfad

## Diagnostischer Algorithmus im Labor 28 bei Anforderung von Lupus-Antikoagulans (Citrat-Blut)



## Gewichtung der APS-Klassifikationskriterien (ACR/EULAR, 2023)

Klinische Domänen	Punkte
<b>Venöse Thromboembolie (VTE)</b>	
- mit hohem VTE-Risikoprofil	1
- ohne hohes VTE-Risikoprofil	3
<b>Arterielle Thrombose</b>	
- mit hohem kardiovaskulärem Risikoprofil	2
- ohne hohes kardiovaskuläres Risikoprofil	4
<b>Mikrovaskuläre Manifestationen</b>	
- vermutet	2
- etabliert	5
<b>Schwangerschaftskomplikationen</b>	
- ≥ 3 konsekutive Frühaborte (< 10+0 SSW) und/oder Fruchttod in der 10+0 bis 15+6 SSW	1
- Fruchttod in der 16+0 bis 33+6 SSW ohne schwere Präeklampsie oder Plazentainsuffizienz	1
- schwere Präeklampsie oder schwere Plazentainsuffizienz < 34+0 SSW mit/ohne Fruchttod	3
- schwere Präeklampsie und schwere Plazentainsuffizienz < 34+0 SSW mit/ohne Fruchttod	4
<b>Herzklappen</b>	
- verdickt	2
- Vegetationen	4
<b>Thrombozytopenie (mind. 20-130 G/l)</b>	2
<b>Labordomäne (Abstand ≤ 3 Jahre zum klinischen Ereignis)</b>	<b>Punkte</b>
<b>Lupus-Antikoagulans (LA) – ohne Interferenz mit Antikoagulantien</b>	
- einmalig positiv	1
- persistierend positiv (2x im Abstand von ≥ 12 Wochen)	5
<b>aCL und/oder aβ2GPI (ELISA) - 2x im Abstand von ≥ 12 Wochen</b>	
- nur IgM: mittel bis hoch positiv für aCL und/oder aβ2GPI	1
- IgG: mittelhoch positiv für aCL und/oder aβ2GPI	4
- IgG: hoch positiv für aCL <u>oder</u> aβ2GPI	5
- IgG: hoch positiv für aCL <u>und</u> aβ2GPI	7



© copyright Labor 28 MVZ GmbH

\_25\_Antiphospholipid-Syndrom, verifiziert: 08/2024

